


CHRONOLOGIE

1. NUCLÉUS d'AVRIL-MAI pour PRODUCTION de MIEL FIN JUIN

Suivant les années, dans le Jura, ces ruches peuvent produire du miel de tilleul, de montagne ou de sapin. Réaliser ces ruches de production sur 1 seul corps. A hiverner sur 1 seul corps.



Pour le Jura :

Avant Fin Août, enlever la dernière hausse. Mettre les lanières pour le traitement contre les Varroas et nourrir de 10 Kg.

8 jours après, nourrir à nouveau pour obtenir 26 Kg. Début Octobre, vérifier le poids de 26 Kg et compléter en sirop si besoin. En pesée arrière au peson, on doit obtenir 13 à 14Kg.

2. RÉCOLTE au CHASSE-ABEILLES

Pour préparer la récolte, en après-midi, entre la grille à reine et les hausses pleines, intercaler 2 hausses à miel vides + le plateau chasse-abeilles par-dessus.

Le lendemain après-midi, récolter les hausses pleines.



3. TRAITEMENT VARROAS et NOURRISSEMENT avant FIN AOÛT

Après les dernières récoltes de miel, enlever toutes les hausses à miel et traiter contre varroas.

Avant fin Août (avant la miellée de Lierre), effectuer un premier nourrissage de 10Kg et un 2^{ème} nourrissage 8 jours après, pour obtenir une pesée arrière de la ruche entre 13 et 14Kg.

Au 5 Octobre, renourrir si nécessaire pour obtenir à nouveau une pesée arrière de la ruche entre 13 et 14Kg (on doit avoir des provisions à la place du couvain éclos), et préparer l'hivernage.

4. HIVERNAGE

Pour favoriser le développement du couvain de la colonie et réduire la consommation, il est conseillé de fermer le Fond version Ventilation Totale au 5 octobre (pour la Franche-Comté) avec la Plaque d'Hivernage blanche comportant les ventilations latérales (percée de 5 trous Ø 3,5mm si nécessaire). Ajouter les Isolants (2 rectangles de 40x20x4,5Ht cm de Laine de Chanvre) dans les bacs du Nourrisseur Couvre-Cadres.

Les Isolants pourront être laissés dans le Nourrisseur à l'année (sauf période de nourrissage).

La Plaque d'Hivernage devra être retiré à la pause de la 2^{ème} Hausse à miel ou à la Transhumance.